

Capital Eye Consultants

Cirugía de Pterigio

Instrucciones Post-Operatorias

La primera noche.

Cuatro (4) horas después de la cirugía se puede quitar el parche de el ojo y comenzar a usar las medicinas. Una gota de Zymaxid y una gota en la noche. Colocar el parche para dormir.

Si se siente incomodo puede usar la medicina recetada para el dolor o cualquier otra medicina sin receta medica como Tylenol, Advil, aspirina, etc.

Si estas medicinas no controlan el dolor, por favor contacte al doctor.

Continue el uso de todas las medicinas hasta que se le oriente lo contrario.

El Dia Después de Cirugía

Traiga sus gotas a su visita.

Las Seguentes Semanas

Zymaxid. Una gota 4 veces al dia durante 1 semana.

Pred Forte. Una gota 4 veces al dia por 6–8 semanas.

Gotas Artificiales. Una gota 4 o 5 veces al dia durante una semana. Después cada vez que las necesite.

Las gotas son para el ojo operado solamente, las puede usar a la misma ves separandolas por 3 minutos. Es normal que la gotas ardan. Cierre el ojo gentilmente por 1 minuto después de cada gota. Por favor traiga sus gotas a cada visita, después de la cirugía.

Actividades

No se toque ni rasque los ojos por 8 semanas. Use el parche para dormir por las primeras 1 o 2 semanas. No use maquillaje por 7 dias. Puede leer y ver television cuando y cuanto usted quiera. Puede volver a manejar y a trabajar cuando se sienta listo. Podra resumir otras actividades mientras valla sanando.

En caso que dolor severo o perdida de la vista, LLAME IMEDIATAMENTE a 703-876-9630.

Recuperacion

La recuperacion de la vista varía con cada paciente. Quizas note la vision un poco nublada, los parpados caidos o inflamados. Esto por lo general es una condicion temporal. Si no se siente comodo manejando u operando equípos pesados, por favor no lo haga. Notara que el sol y la claridad le molesta, use lentes para el sol cada ves que necesite.